

اثرات درمانی:

لووفلوکساسین از طریق مهار فعالیت آنزیم DNA gyrase در همانندسازی DNA باکتری اختلال ایجاد می کند و در نتیجه سنتز DNA باکتری مهار می شود، به این ترتیب از تکثیر باکتری جلوگیری می شود و اثرات باکتریسیدی ایجاد می کند.

موارد مصرف دارو:

لووفلوکساسین در درمان عفونت های باکتریایی پوست، سینوس ها، کلیه، مثانه، پروستات و همچنین در درمان بیماری های عفونی، برونشیت، پنومونی و درمان بیماری های سیاه زخم و طاعون استفاده میشود.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.

فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

این دارو برای برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

در صورت مصرف داروهای حاوی پتاسیم و منیزیم قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت هرگونه واکنش آلرژیک مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

به دلیل این که لووفلوکساسین روی باکتری های گرم مثبت اثر گذاری خوبی دارد، بنابراین در عفونت های تنفسی داروی مناسبی محسوب میشود.

موارد منع مصرف:

افرادی که به این دارو و سایر داروهای دسته فلوروکینولون ها حساسیت مفرط دارند.

افرادی که دچار نوعی از بی نظمی ریتم قلب هستند و یا سطح پتاسیم خون آنها پایین است.

افرادی که سابقه بیماری میاستنی گراویس دارند.

افرادی که التهاب یا پارگی تاندون مربوط به مصرف داروهای گروه فلوروکینولون دارند.

تداخلات دارویی:

قبل از استفاده این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد اسید حاوی آلومینیوم، کلسیم، منیزیم، دیدانوزین، سولفات آهن، سولکرافیت و روی، مصرف این داروها ممکن است جذب لووفلوکساسین را کاهش دهد، بنابراین مصرف همزمان آنها توصیه نمی گردد. بهتر است بین مصرف هر یک از این داروها با لووفلوکساسین حداقل ۲ ساعت فاصله باشد.

داروهای ضدآرتمی مانند کینیدین، پروکائین آمید، آمیودارون، سوتالول بهتر است بین مصرف هر یک از این داروها با لووفلوکساسین فاصله باشد. در مصرف همزمان احتمال بروز آریتمی قلبی به علت طولانی شدن فاصله QT در نوار قلب، ممکن است افزایش یابد.

در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهای کنترل کننده قند خون یا انسولین، مصرف همزمان این داروها با لووفلوکساسین ممکن است منجر به کاهش یا افزایش قند خون شود لذا پایش میزان قند خون توصیه میشود.

مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی با لووفلوکساسین احتمال بروز تحریک سیستم اعصاب مرکزی و حملات تشنجی را ممکن است افزایش دهد.

مصرف همزمان داروهای کورتیکواستروئیدی با لووفلوکساسین منجر به پارگی تاندون های شانه، دست، آشیل یا سایر تاندون ها گردد که نیاز به عمل جراحی داشته و یا آن که منجر به ناتوانی طولانی مدت به خصوص در افراد سالخورده می گردد. وارفارین - لووفلوکساسین باعث تشدید اثرات وارفارین می گردد.

هشدارها و احتیاط ها:

در صورت عدم بهبودی علائم طی چند روز از شروع مصرف دارو یا بدتر شدن آن با پزشک خود مشورت نمایید.

این دارو ممکن است در برخی افراد باعث حساسیت بیشتر پوست نسبت به نور خورشید شود، تماس با نور خورشید حتی برای دوره های کوتاه زمانی ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید، بهثورات جلدی، قرمزی، خارش یا سایر تغییرات رنگی پوست گردد، در صورت



واکنش شدید به نور خورشید، با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت بروز بثورات جلدی با سایر علائم واکنش آلرژیک، مصرف این دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی، منگی، خواب آلودگی یا کاهش هوشیاری گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.

لوفلوکساسین ممکن است باعث درد، التهاب یا پارگی تاندون شود، در صورت مشاهده این علائم در دست ها، شانه ها، ساق ها، مصرف دارو را قطع نموده و بلافاصله با پزشک تماس حاصل نمایید و از انجام فعالیت های ورزشی خودداری نمایید، مگر آنکه پزشک دستور داده باشد. مصرف این دارو در برخی بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، ممکن است باعث هیپوگلیسمی گردد، علائم کمی قند خون باید قبل از آنکه منجر به بیهوشی گردد، درمان شود. این علائم در افراد مختلف ممکن است متفاوت بوده و شامل خستگی یا ضعف، احساس اضطراب، تاری دید، عرق سرد، اشکال در تمرکز، خواب آلودگی، گرسنگی شدید، سردرد، تهوع، عصبانیت، ضربان سریع قلب، لرزش غیر طبیعی می باشد، در صورت مشاهده هریک از این علائم، مصرف دارو را قطع کرده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

مصرف این دارو در بیماران مبتلا به پایین بودن مقدار پتاسیم خون، ممکن است منجر به ضربان تند، کند یا نامنظم قلب گردد.

توصیه میشود در طی درمان مایعات فراوان بنوشید.

دارو را در ساعت دقیق مصرف نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک و داروساز خود مشورت نمایید:

بثورات جلدی، خارش، قرمزی پوست، درد یا گرفتگی شدید ناحیه شکم یا معده، حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار، آشفته گی، تاول، اسهال آبکی شدید یا خونی، تب، توهمات، درد، التهاب یا تورم ساق ها، شانه ها یا دست ها، جنون، لرزش، برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل درد یا ناراحتی معده یا شکم، تغییر حس چشایی، یبوست، گیجی، سردرد، منگی، تهوع، عصبانیت، اشکال در به خواب رفتن، خارش، ترشح واژن و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دروان بارداری و شیردهی حتماً باید با تشخیص پزشک صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)

تهران - ایران

