

**اثرات درمانی:**

ایبوپروفن یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) است که برای درمان درد و التهاب استفاده می‌شود. فاموتیدین ممکن است به کاهش خطر زخمهای ناشی از استفاده NSAID ها کمک کند.

**موارد مصرف دارو:**

قرص فاموتیدین + ایبوپروفن ترکیبی از یک داروی ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAID) (ایبوپروفن) و آنتاگونیست گیرنده H<sub>2</sub> هیستامین (فاموتیدین) برای تسکین علائم و نشانه های روماتیسم مفصلی، استئوآرتریت و هرگونه درد و التهاب و کاهش خطر ابتلا به زخمهای گوارشی فوقانی کاربرد دارد.

**راهنمایی های عمومی برای بیمار:**

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.

فروش بدون نسخه پزشک ممنوع می باشد.

می توانید دارو را همراه یا بدون غذا مصرف نمایید.

با یک لیوان پر از آب دارو را مصرف نمایید.

قرص را به طور کامل بلعیده و از جویدن و خرد کردن آن خودداری نمایید.

**مقدار و نحوه مصرف:**

قرص فاموتیدین + ایبوپروفن را تحت نظر و تجویز پزشک مصرف کنید.

**موارد منع مصرف:**

در صورت حساسیت شدید به دارو یا اجزاء جانبی بکار رفته.

داشتن سابقه آسم، کهیر یا واکنشهای آلرژیک پس از مصرف آسپیرین یا سایر NSAID ها.

حساسیت شناخته شده به سایر آنتاگونیست های گیرنده H<sub>2</sub>.

در زمینه جراحی CABG.

**هشدارها و احتیاط ها:**

سمیت کبدی: علائم و نشانه های هشدار دهنده سمیت کبدی را از پزشک خود سوال کنید.

فشار خون بالا: بیمارانی که برخی از داروهای کاهنده فشار خون را مصرف میکنند ممکن است هنگام مصرف NSAID ها، درمان آنها مختل شود پس هنگام مصرف این دارو فشار خون را کنترل کنید.

نارسایی قلبی و ادم: از مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شدید قلبی خودداری کنید.

خونریزی فعال: خونریزی فعال و بالینی قابل توجه از هر منبعی ممکن است رخ دهد.

در صورت خونریزی فعال مصرف قرص را قطع کنید.

سمیت کلیوی: عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی یا کلیوی، نارسایی قلبی و هیپوولمی

بررسی شود و از مصرف این قرص در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی پیشرفته جلوگیری نمایید.

شوگ آتافیلاکسی (شوگ آلرژی): در صورت بروز شوگ آتافیلاکسی با اورژانس تماس بگیرید.

حساسیت پوستی: دارو را در اولین مشاهده بثورات پوستی یا سایر علائم حساسیت متوقف کنید.

مسمومیت هماتولوژیک هموگلوبین یا هماتوکریت را کنترل کنید.

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) باعث افزایش خطر حوادث ترومبوتیک قلبی

عروقی می شود. NSAID ها باعث افزایش خطر عوارض جانبی دستگاه گوارش (GI) از جمله

خونریزی، زخم و سوراخ شدن معده یا روده می شوند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی: این دارو برای زنان باردار استفاده نمی شود.



## تداخلات دارویی:

داروهای رقیق کننده خون (وارفارین ، کومادین)  
داروهای ضد افسردگی (سیتالوپرام ، اس سیتالوپرام ، فلوکستین ، فلووکسامین ، پاروکستین، سرتالین، ترازودون یا ویلزودون).  
آسپیرین، لورازپام، آموکسی سیلین/ کلاوولانات، دیفن هیدرامین، رزواسستاتین، آپیکسابان، استامینوفن/ آسپیرین/ کافئین، داپاگلیفلوزین روغن ماهی (اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳)، مترونیدازول، سیکلو پنزاپرین، متوپرولول سوکسینات ER، متوپرولول تارترات، استامینوفن/ هیدروکودون، کلپیدوگرل، انسولین، استامینوفن ویتامین D<sub>3</sub> (کوله کلسیفرول)، ستیریزین.  
عوارض جانبی:

الف: عوارض جانبی شایع تر (بیش از ۱٪) شامل موارد ذیل می باشد:  
تهوع ، استفراغ، اسهال، یبوست ، درد در قسمت فوقانی شکم و سردرد.

ب : سایر عوارض جانبی:

علائم واکنش آلرژیک مانند راش، خارش، قرمزی، تورم، تاول یا لایه برداری پوست با تب یا بدون تب، خس خس سینه یا گلو، درد در قفسه سینه، مشکل در تنفس، بلع، صحبت کردن، گرفتگی صدا غیر معمول یا تورم دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو.  
علائم مشکلات کلیوی (مشکلات ادراری) مانند ناتوانی در دفع ادرار، تغییر در میزان ادرار دفع شده، خون در ادرار یا وزن زیاد.

علائم خونریزی مانند (سرفه کردن یا خون در ترشحات سرفه) خون در ادرار مدفوع سیاه یا قرمز، خونریزی داخلی غیر طبیعی، کبودی بدون علت یا خونریزی که نمی توانید متوقف کنید.  
نشانه هایی از سطوح بالای پتاسیم مانند ضربان غیر طبیعی قلب، احساس گیجی، احساس ضعف، سرگیجه، احساس غش کردن، بی حسی یا سوزن سوزن شدن یا تنگی نفس.  
علائم فشار خون بالا مانند (سردرد یا سرگیجه غش کردن) یا اختلال در دید.  
درد یا فشار در قفسه سینه.

ضعف در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا فکر کردن، عدم تعادل، افتادگی در یک طرف صورت یا تاری دید.

تنگی نفس یا تورم در بازوها یا پاها.

احساس خستگی یا ضعف بسیار.

افسردگی یا سایر تغییرات خلقی.

صدای زنگ در گوش.

اختلال در دید.

علائم شبه آنفولانزا.

یک واکنش شدید پوستی (سندرم استیون - جانسون / نکرولیز اپیدرمی سمی) ممکن است اتفاق بیفتد این میتواند مشکلات سلامتی شدیدی ایجاد کند که ممکن است از بین نرود، پس اگر علائم فوق را دارید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

پوست متورم، تاول دار یا پوسته پوسته شده (با تب یا بدون تب)، چشمهای قرمز یا تحریک شده، یا زخم در دهان، گلو، بینی و یا چشم.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تجویز شده، به بیمارستان مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

