

روز: استامینوفن / دکسترومتورفان / فنیل افرین

شب: استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین

اثرات درمانی:

ساشه سرماخوردگی روز و شب با طعم لیمو در بسته بندی (۱۰ تایی) ۷ عدد ساشه روز و ۳ عدد ساشه شب که هر ساشه روز حاوی ۶۵۰ میلی گرم استامینوفن، ۱۰ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۲۰ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید و هر ساشه شب حاوی ۶۵۰ میلی گرم استامینوفن، ۱۰ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۲۵ میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف دارو:

ساشه سرماخوردگی روز و شب به صورت پودر برای تهیه محلول خوراکی جهت تسکین علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا، سینوزیت، رینیت آلرژیک یا سایر عوارض ناشی از آلرژی بخش فوقانی دستگاه تنفسی، احتقان بینی، عطسه، آبریزش بینی، تب، سردرد و دردهای خفیف استفاده می شود.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.

محتویات ساشه را در نصف لیوان آب گرم ریخته در صورت تمایل می توانید مقداری شیرین کننده مانند عسل اضافه کنید و خوب هم زنید تا کاملاً پودر حل شود، در حین هم زدن بخور آن را تنفس کنید و سپس جرعه جرعه محلول و تمام محتویات را به صورت کامل میل نمایید.

سوسپانسیون تهیه شده طی ۳۰ دقیقه میل شود.

این دارو ممکن است باعث گیجی، خواب آلودگی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به مواد تشکیل دهنده مانند استامینوفن، فنیل افرین، دکسترومتورفان و دیفن هیدرامین، ویتامین ث و یا هریک از مواد تشکیل دهنده این محصول از مصرف این فرآورده خودداری نمایید.

در صورتی که داروهای مهار کننده مونوآمین اکسیداز مانند فنلزین و ایزوکربوکسازید را طی دو هفته گذشته و یا در حال حاضر مصرف می کنید از مصرف این فرآورده خودداری نمایید.

در صورت نارسایی کبد و کلیه، ممکن است اثرات ناخواسته دارو به علت تجمع دارو در بدن بروز کند.

تداخلات دارویی:

بتابلاکر ها مانند پروپرانولول، فورازولیدون، ایندومتاسین، ایزونیازید، مهارکننده های مونوآمینواکسیداز مانند فنلزین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین، داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین و دیگوکسین، گوانتیدین، متیل دوبا، رزپرین، بروموپریتین و یا هیدانتوتین ها مانند فنی توتین

هشدارها و احتیاط ها:

در صورت داشتن مشکلاتی همانند گلوکوم زاویه بسته، فئوکروموسایتوما، بزرگ شدن پروستات، بیماری های انسدادی عروق همانند سندروم رینود، نارسایی های کبد و کلیوی، شرایطی که باعث کاهش گلاتاتیون می شود همانند سپسیس و یا اعتیاد به الکل قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

کودکان در سن کمتر از ۱۲ سال به اثرات این دارو حساسیت بیشتری دارند و مصرف این دارو در این افراد توصیه نمی شود.

افراد مسن به عوارض این دارو حساسیت بیشتری دارند و تعداد بیشتری از آنها دیده می شود.

در صورت وجود فشار خون بالا کنترل نشده و پرکاری تیروئید کنترل نشده این دارو با احتیاط مصرف شود، زیرا میزان فنیل افرین این محصول می تواند باعث افزایش ضربان قلب گردد.



به علت ترکیبات شیرین کننده موجود در محصول، در صورت وجود دیابت و سطح قند خون بالا این دارو با احتیاط مصرف گردد. در صورت مصرف نوشیدنی های الکلی و یا هپاتیت و سایر مشکلاتی که منجر به آسیب کبدی میشود، احتمال تجمع دارو در بدن و بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.

از مصرف منظم داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی همراه با این دارو خودداری نمایید.

در صورت اختلال شدید در عملکرد کبد، فشار خون بالا یا فرد مستعد به احتباس ادرار با احتیاط مصرف نمایید.

چنانچه علائم طی یک هفته بهبود نیافت و یا تب بالا همراه شد دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن ممکن است باعث مسمومیت گردد.

در هنگام مصرف ساشه سرماخوردگی الکل مصرف نکنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هرکدام از اثرات جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید:

واکنش آلرژیک، کم خونی، عوارض قلبی، تحریک سیستم اعصاب مرکزی، گیجی و بی قراری شدید، سمیت کبدی، گلودرد، تب، زرد شدن چشم ها یا پوست، خستگی و یا ضعف غیرعادی، تحریک پذیری شدید، افزایش فشار خون، کم شدن ضربان قلب و انقباضات و درد معده، سردرد مداوم و شدید، تنگی نفس و حملات تشنجی

بارداری و شیردهی:

گزارشی از بروز عوارض با مصرف این دارو در دوران بارداری مشاهده نشده است، اما مصرف این دارو به مدت طولانی می تواند احتمال بروز خطر را افزایش دهد.

این دارو با غلظت کم در شیر مادر ترشح می شود، با این وجود هیچ گونه عوارض جانبی برای آن گزارش نشده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)

تهران - ایران

