

اثرات درمانی:

قرص بی‌زوپرولول دارویی در دسته داروهای مهار کننده گیرنده بتا آدرنژیک (بتا بلاکر انتخابی) است که برای بهبود و درمان مشکلات قلبی و عروقی مصرف می‌گردد.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بهبود علائم مشکلات قلبی و عملکرد قلب، تنظیم ضربان قلب، کاهش فشار خون و خونرسانی به قلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

حساسیت به این دارو و سایر داروهای مسدود کننده بتا آدرنژیک، سالمندان، اعمال جراحی
مصرف برخی داروها مانند انسولین، داروهای کاهنده قند خون، بلاک کننده های گیرنده کلسیمی، کلونیدین، تتوفیلین، مهارکننده های مونوآمینو اکسیداز، سمپاتومیمتیک های مثل سالمتروپول، داروهای مورد استفاده در ایمونوتراپی آلرژی و عصاره های آلرژیک جهت تست پوستی.

در صورت وجود سایر بیماریها و شرایط ویژه:

سابقه آلرژی، آسم، آمفییزم یا برونشیت غیر آلرژیک، نارسایی احتقانی قلب و یا واکنش آلرژیک خفیف همچون رینیت آلرژیک و راش پوستی، کم خونی، ادم، فشار خون بالا، دیابت، نقص عملکردی کبدی و یا کلیوی، پرکاری تیروئیدی، بیماری ایسکمی قلبی، افسردگی یا سابقه ابتلاء به آن، بیماری عروق محیطی، مایستنی گراوایس، پسوریازیس، سندرم رینود، فتوکروموسیتوما، ضعف عضلانی و اسیدوز متابولیک.
به علت احتمال بروز سرگیجه و خواب آلودگی، در هنگام رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، احتیاط نمایید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ماده موثره بی‌زوپرولول و یا سایر داروهای مسدود کننده بتا آدرنژیک.

شوگ قلبی، نارسایی قلبی کنترل نشده، بلوک درجه دو یا سه دهلیزی - بطنی و برادی کاردی سینوسی

تداخلات دارویی:

مصرف این دارو با داروهای زیر تداخل دارد:

باربیتورات ها، مهارکننده های کانال کلسیمی (نیفدپیین و وراپامیل)، فلکانتینید ها، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی خصوصاً ایندومتاسین، انسولین، داروهای کاهنده قند خون خوراکی، سمپاتومیمتیک ها، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (سلزلین، پروکاربازین و فلوئوزلیدین)، داروهای مسدود کننده عصبی - عضلانی، فرآورده های حاجب حاوی ید، مهارکننده های استیل کولین استراز، گلیکوزید های قلبی، داروهای بیهوشی، آنتی سایکوتیک ها، سولفونیل اوره، فتوتیازین ها، داروهای ضد مالاریا، استروژن ها، کلونیدین، اپی نفرین، فینگولیمود، لیدوکائین، آمیودارون، سایمتیدین، فنی توفین، تتوفیلین، موکسی فلوکسازین، نیکوراندیل، لودودپار، ریسپریدون، ریواسیتگمین، یوهیمین، نیکوتین، نیتروگلیسرین، کوکائین، دی-پریدامول، فتانیل، دلوکستین، دلیتازم، آپریپتانت

هشدارها و احتیاط ها:

این دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مصرف خودسرانه آن بپرهیزید.

در حین درمان با این دارو در فواصل منظم به پزشک معالج مراجعه نمایید تا روند بهبودی شما بررسی گردد.

از قطع مصرف دارو بدون نظر پزشک معالج خودداری نمایید.

بخطرات داشته باشید که این دارو فشار خون بالا را درمان نمی کند ، بلکه آن را کنترل می کند، بنابراین ممکن است مصرف آن برای تمام عمر لازم باشد.

مصرف این دارو در بیماران دیابتی ممکن است منجر به پوشاندن علائم کاهش قند خون و یا طولانی کردن کاهش قند خون و یا افزایش قند خون گردد.

در صورت بدتر شدن نشانه های نارسایی قلبی از جمله تنگی نفس و افزایش وزن با پزشک معالج مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته گردد، اگرچه هر این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

در صورت بروز هر کدام از اثرات جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید:



عوارض شایعتر:

کاهش توانایی جنسی، اشکال در صحبت کردن، خواب آلودگی، ضعف و خستگی غیر معمول

عوارض با شیوع کم:

برادی کاردی، افسردگی، برونکواسپاسم، سرگیجه، نارسایی قلبی، کاهش جریان خون محیطی، اضطراب، عصبانیت، بیوست، اسهال، احتقان بینی، تهوع و استفراغ، ناراحتی معده

عوارض نادر:

واکنش های حساسیت همچون پوستی، آریتمی، کمر درد، درد مفاصل، درد قفسه سینه، گیجی، توهم، سمیت کبدی، افت فشار خون وضعیتی، لکوپنی، ترمبوسیتوپنی و ضایعات پوستی پسوریاتیک، تغییر در حس چشایی، خشکی چشم، خارش پوست، کابوس، آنژیوادم

بارداری و شیردهی:

از نظر مصرف در بارداری جزء گروه C بوده و بایستی تحت نظر پزشک معالج منافع مصرف به مضرات آن سنجیده شود.

از نظر مصرف در شیردهی اطلاعات کافی در خصوص ترشح دارو در شیر مادر وجود ندارد، لذا مصرف این دارو در شیردهی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

دارو را در جای خشک، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دور از دیدو دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)

تهران - ایران

