

اثرات درمانی:

قرص داپوکستین ۳۰ و ۶۰ میلی گرم که مهارکننده باز جذب سروتونین (SSRI) است و در درمان اختلالات جنسی بکار می رود.

موارد مصرف دارو:

جهت درمان انزال زودرس در مردان استفاده می شود و زمان انزال را افزایش داده و کنترل بر انزال را بهبود می بخشد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قرص را به طور کامل بلعیده، از جویدن یا خرد کردن آن خودداری نمایید.
این دارو را همراه یا بدون غذا و با حداقل یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.
این دارو نباید پیش از یکبار در هر ۲۴ ساعت مصرف شود.
این دارو را یک تا سه ساعت قبل از فعالیت جنسی مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت شدید به دارو یا اجزاء جانبی بکار رفته
در صورت وجود مشکلات قلبی از قبیل نارسایی قلبی یا اختلال در ضربان قلب، سابقه غش، سابقه مانیا یا افسردگی شدید، مشکلات متوسط یا شدید کبدی، نارسایی کلیوی

تداخلات دارویی:

چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید:
داروهای افسردگی با نام مهار کننده های مونوآمین اکسیداز، تیوریدازین، لیتیموم، لینزولید، تریپتوفان، ترامادول، داروهای ضد میگرن
داروهای اصلی عفونت قارچی از جمله کتوکنازول و ایتراکنازول، فلوکنازول
داروهای خاص برای HIV از جمله ریتوناویر، ساکوناویر، نلفیناویر
آنتی بیوتیک های خاص برای درمان عفونت از جمله آزیترومایسین، کلاریترومایسین
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی از قبیل ایبوپروفن و استیل سالیسیلیک اسید
داروهای رقیق کننده خون از جمله وارفارین
داروهای مورد استفاده برای درمان اختلال نعوظ از جمله سیلدنافیل، تادالافیل، چنانچه این داروها به محض ایستادن فشار خون بالا را پایین تر بیاورند.
آپریتانت جهت درمان حالت تهوع، نفازودون، الکل

هشدارها و احتیاط ها:

در صورت احساس ضعف شدید، سرگیجه یا منگی بلافاصله دراز کشیده به نحوی که سرتان پایین تر از بقیه بدنتان یا به گونه ای بنشینید که سرتان بین زانوهایتان قرار گیرد تا علائم رفع شود.
این دارو ممکن است باعث گیجی، کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، با احتیاط مصرف نمایید.



اگر هر يك از موارد زير در شما ديده مي شود، قبل از مصرف داپوكستين با پزشك يا داروساز خود مشورت نماييد:

در صورت وجود مشكلات جنسي ديگري از قبيل اختلال نعوظ

وجود سابقه سرگيجه ناشي از فشار خون پايين

مصرف داروهائي از قبيل اكستازي، متيل دي اكسي مت آمفتامين، اسيد لايبرژييك دي اتيل آميد، ناركوتيک ها، بنزوديازين ها

مصرف الكل، بيماري صرع، سابقه خونريزي يا مشكلات لخته شدن خون، مشكلات كليوي

ابتلا به فشار بالا ي چشم (گلوگوم) يا در معرض خطر ابتلا به آن

بيماران با مشكلات نادر ارثي عدم تحمل گالاكتوز: كمبود لاکتاز يا سوء جذب گلوکز-گالاكتوز

عوارض جانبي:

هر دارو به موازات اثر درماني ممكن است باعث بروز بعضي عوارض ناخواسته نيز بشود، اگرچه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود در صورت بروز عوارض زير با پزشك و داروساز مشورت نماييد:

تشنج، غش يا احساس گيجي (سبكي سر) در هنگام ايستادن، هرگونه تغيير در خلق و خوي،

هرگونه تفكر نسبت به اقدام خودكشي و يا آسيب به خود، احساس سرگيجه و سردرد، احساس

تحريك پذيري، دلاپسي، بي قراري، احساس كرختي (بي حسي)، مشكل دستيابي به نعوظ يا حفظ

آن، تعرق غير طبيعي يا گرگرفتگي، اسهال، درد معده، مشكل در خوابيدن يا كابوس هاي شبانه،

احساس خستگي و خواب آلودگي، خميازه كشيدن، احتقان بيني، افزايش فشار خون، مشكل در

تمرکز، لرزش، ميل كمتر در رابطه جنسي، زنگ در گوش، تاري ديد، سوء هاضمه، خشكي دهان،

تغيير در خلق و داشتن هيجانان بيش از اندازه، اختلال يا عدم توانايي انديشيدن، تپش قلب كند

يا نامنظم يا افزايش ضربان قلب، از بين رفتن ميل جنسي، مشكل در به ارگاسم رسيدن، احساس

ضعف، بيهوشي، احساس افسردگي، احساس داغي، عصبي غير عادي، مشكلات بينايي، چشم درد يا

گشادي مردمک چشم، فشار خون پايين يا بالا، احساس عرق سرد يا خارش، احساس چرخيدن،

احساس داشتن طعم غير طبيعي، دندان قروچه

بارداري و شيردهي:

اين دارو در دوران بارداري و شير دهی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداري:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دور از ديد و دسترس کودکان نگهداری نماييد.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامي خاص)

تهران - ايران

