

اثرات درمانی:

این دارو شامل ۳۲۵ میلی‌گرم استامینوفن، ۵ و ۱۰ میلی‌گرم اکسی کدون است. استامینوفن یک مسکن و ضد تب و اکسی کدون یک مخدر ضد درد است.

موارد مصرف دارو:

تسکین تب و درد متوسط تا شدید

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید. فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید. دارو را بطور ناگهانی قطع نکنید و برای قطع دارو یا پزشک خود مشورت کنید. بیماران نباید بیشتر از دوز تجویز شده استفاده کنند و همزمان از مصرف محصولات حاوی استامینوفن خودداری کنند. با توجه به خطرات سوء مصرف و اعتیاد اکسی کدون تنها زمانی که با مابقی مسکن ها درمان نشده باشند، تجویز میشود. در صورت استفاده این دارو اگر سوال یا نکته ای مهم به نظرتان رسید با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به استامینوفن، اکسی کدون و اجزای سازنده این محصول، الانزایمن، مصرف الکل، بیماران مبتلا به بیماری های کبدی، بیماران مبتلا به آسم و تنگی نفس، بیماری کلیوی، آسیب به سر یا تشنج، مشکلات اردار، بیماران مبتلا و یا احتمال ابتلا به انسداد روده، مشکلات تیروئید، مشکلات پانکراس یا کیسه صفرا

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع سازید. داروهای آنتی هیستامین، داروهای درمان سرماخوردگی، داروهای درمان آسم و بیماری مزمن ریوی (COPD)، داروهای ضد درد اپیوئیدی، داروهای دیورتیک، داروهای درمان بیماری حرکت (Motion sickness)، بیماری التهابی روده (IBD) و پرکاری مثانه، داروهای مخدر دیگر، داروهای بنزودیازپینی (مانند دیازپام، آلپرازولام، لورازپام و ...)، داروهای خواب آور داروهایی که باعث دپرسیون تنفسی می شوند. داروهای شل کننده عضلات، داروهای موثر بر سطح سروتونین، داروهای درمان افسردگی، پارکینسون، میگرن، داروهای ضد استفراغ، فنوتیازین، نالتروکسان، تالیدوماید، پروپنسید، وریکونازول، داروهای بتابلاکر (مانند پروپرانولول، متوپرولول و ...)، پرگالین، سلوکوسیب، داروهای سرکوب کننده CNS، آب گریپ فروت، الکل

هشدارها و احتیاط ها:

- بیماران که دوره درمان آن ها با قرص های استامینوفن/اکسی کدون چند هفته طول کشیده در صورتی که نیاز به ادامه دارو ندارند نباید به طور ناگهانی دارو را قطع کنند.
- در بیماران کبدی پاکسازی پلاسمای اکسی کدون کاهش یافته و نیمه عمر افزایش یافته که هنگام استفاده از اکسی کدون برای این بیماران باید با احتیاط باشد.
- تعیین مقدار و دوز قرص های استامینوفن/اکسی کدون برای بیماران سالمند نیازمند احتیاط ویژه است.
- احتمال بروز اعتیاد و سوء مصرف به این دارو وجود دارد.
- این دارو ممکن است باعث سرگیجه یا خواب آلودگی شود لذا پس از مصرف این دارو از انجام کارهایی مانند رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری کنید.
- مصرف بیش از حد استامینوفن میتواند باعث آسیب جدی به کبد و مرگ شود. در صورت درد فوقانی شکم و از دست دادن اشتها و اردار تیره و یا پرقان (زرد شدن پوست و چشم) حتما به پزشک مراجعه کنید

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و داروساز مشورت نمایید.
- آکنه، دپرسیون تنفسی، تورم (صورت، لب، زبان) خشکی دهان، افت فشار خون، سبکی سر، سرگیجه، خواب آلودگی، شوک، کهیر، خارش، گیجی، سردرد
 - بیوست، تهوع استفراغ، درد شکمی، بی خوابی، گرگرفتگی، اختلالات بینایی (تاری دید)، میوز (تنگی مردمک چشم)، قرمزی چشم، کاهش شنوایی
 - بی حالی، تشنگی، تب، ضعف خستگی
 - افزایش تعریق، واکنش آنافیلاکسی، واکنش آلرژیک، سندرم استیون جانسون
 - اختلال ذهنی، گیجی، افکار و رفتار غیر عادی
 - مشکلات دفع اردار



- مشکلات کبدی، درد قسمت فوقانی معده، از دست دادن اشتها، ادرار تیره، یرقان
- پایین بودن سطح کورتیزول، بیماری آدیسون
- آگرانولوسیتوز، نوتروپنی
- علائم سندرم سروتونین: مانند بی قراری، توهم، تب، لرز، ضربان قلب بالا، سفتی عضلات، از دست دادن هماهنگی، حالت تهوع، اسهال
- مشکلات تنفس (که در افراد مسن و افرادی که اضافه وزن، سوء تغذیه و ناتوان بیشتر است)
- استفاده طولانی از مواد مخدر در ناباروری مردان و زنان تاثیر دارد.

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی از مصرف این دارو اجتناب نمایید.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
دارو را دور از حرارت نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

