

اثرات درمانی:

استامینوفن که با نام پاراستامول نیز شناخته می‌شود، دارویی با اثرات ضد درد و تب‌بر است. این دارو برای کاهش دردهای خفیف تا متوسط و کاهش تب به‌کار می‌رود. مکانیسم اثر دقیق استامینوفن به‌طور کامل مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد از طریق مهار آنزیم‌های سیکلواکسیژناز، به‌ویژه در سیستم عصبی مرکزی، باعث کاهش تولید پروستاگلاندین‌ها شده و در نتیجه موجب کاهش درد و تب می‌شود.

موارد مصرف دارو:

شیاف استامینوفن برای موارد زیر مصرف می‌شود:

- کاهش تب در کودکان و بزرگسالان
- تسکین دردهای خفیف تا متوسط

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو باید فقط از راه مقعدی مصرف شود و نباید خورده شود.
- پیش از مصرف، دست‌ها را به‌خوبی بشویید. در صورت نرم شدن شیاف، می‌توان آن را چند دقیقه در یخچال یا زیر جریان آب سرد، بدون باز کردن بسته‌بندی، قرار داد تا سفت شود. سپس شیاف را از پوشش خارج کرده و به‌آرامی از راه مقعد وارد نمایید.
- برای اثر بهتر، بهتر است پس از مصرف شیاف، بیمار چند دقیقه در حالت خوابیده باقی بماند.

- مقدار مصرف دارو باید مطابق دستور پزشک و یا داروساز تنظیم گردد.
- از مصرف بیش از مقدار توصیه‌شده خودداری شود.

موارد منع مصرف:

- در موارد زیر از مصرف شیاف استامینوفن خودداری شود، مگر با نظر پزشک:
- حساسیت شناخته‌شده به استامینوفن و یا هر یک از اجزای فرآورده.
- بیماری شدید کبدی یا نارسایی فعال کبد
- مصرف هم‌زمان سایر داروهای حاوی استامینوفن، در صورتی که مجموع دوز روزانه از مقدار مجاز بیشتر شود.

تداخلات دارویی:

وارفارین و سایر داروهای ضدانعقاد خون، داروهای ضد تشنج مانند فنی‌توئین، کاربامازپین و سایر القاکننده‌های آنزیمی، باربیتورات‌ها، ایزونیازید، پروبنسید، لاموتریژین، بوسولفان، فنوتیازین‌ها، الکل.

هشدارها و احتیاط‌ها:

- هشدار آسیب کبدی در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده.
- مصرف الکل



- وجود بیماری زمینه‌ای کبد
- سوء‌تغذیه یا کاهش ذخایر گلوکوتاتیون
- مصرف داروهای القاکننده آنزیم‌های کبدی
- در صورت بروز بثورات پوستی، تاول، پوسته‌ریزی پوست، زخم دهان، قرمزی شدید پوست یا علائم حساسیت، مصرف دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک مراجعه کنید.
- در بزرگسالان سالم و فاقد بیماری‌های کبدی، مجموع دریافت استامینوفن از تمام منابع دارویی نباید از ۴۰۰۰ میلی‌گرم در ۲۴ ساعت بیشتر شود، مگر طبق دستور پزشک.
- در کودکان، دوز مجاز باید بر اساس وزن بدن محاسبه گردد.

عوارض جانبی:

استامینوفن معمولاً در دوزهای توصیه‌شده به‌خوبی تحمل می‌شود. با این حال، مانند همه داروها ممکن است در برخی افراد عوارض جانبی ایجاد کند.

عوارض احتمالی:

تهوع، استفراغ، ناراحتی معده، یبوست

عوارض نادر:

واکنش حساسیتی شدید، مانند تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو، تنگی نفس یا خس خس سینه، بثورات پوستی شدید، تاول یا پوسته‌ریزی پوست، آسیب کبدی، زردی پوست یا چشم‌ها.

بارداری و شیردهی:

مصرف استامینوفن در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر و تجویز پزشک زمانی انجام شود که منافع مصرف دارو بر خطرات احتمالی آن غلبه داشته باشد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
- برای حفظ کیفیت فرآورده، دارو را در بسته‌بندی اصلی، دور از نور، رطوبت و گرمای زیاد نگهداری نمایید.
- شفاف ممکن است در دمای بالا نرم شود. از قرار دادن دارو در معرض گرمای مستقیم، نور آفتاب، داخل خودرو یا نزدیک منابع حرارتی خودداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج‌شده روی بسته‌بندی خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)

تهران - ایران

