

اثرات درمانی:

هر ۱۰۰ گرم کرم واژینال کلوتریمازول / کلیندامایسین حاوی کلیندامایسین (به صورت فسفات) ۲ گرم، کلوتریمازول ۲ گرم است، که کلیندامایسین به عنوان جزء ضد میکروبی و کلوتریمازول به عنوان جزء ضد قارچ می باشد.

موارد مصرف دارو:

کرم واژینال کلوتریمازول / کلیندامایسین دارویی است که در درمان عفونتهای باکتریایی و قارچی به کار می رود، در درمان واژینوز باکتریایی، کاندیدیازیس، تریکومونایزیس استفاده می شود.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، پرگه راهنما را مطالعه نمایید.
دوز و مقدار این دارو از فردی به فرد دیگر متفاوت است، دارو را دقیقاً همانطور که پزشک به شما تجویز کرده است، استفاده نمایید و از کم یا زیاد کردن مقدار یا مدت مصرف خودداری نمایید.

در صورت عدم کاهش علائم ۳ روز بعد از شروع درمان، یا عدم بهبودی ۷ روز بعد از مصرف دارو، و یا شدت یافتن علائم به پزشک مراجعه کنید.
در ضمن مصرف این دارو برای جلوگیری از عفونت مجدد از پنبه یا نوار بهداشتی و شوشت نخ استفاده نمایید.
در صورت فراموش کردن یک دوز از کرم واژینال کلوتریمازول / کلیندامایسین، در اولین فرصت آن را مصرف نمایید و از دو برابر کردن دوزهای بعدی پرهیز کنید.

دستها را قبل و بعد از استعمال دارو شسته و از تماس دارو با چشم جلوگیری نمایید.

مقدار ۵ گرم (۱ اپلیکاتور)، از کرم واژینال ترجیحاً شب ها استفاده نمایید.

این دارو فقط برای استعمال واژینال می باشد.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به آژول ها، کلیندامایسین، لینکومایسین یا سایر اجزای فرمولاسیون
- سابقه بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو یا کولیت مرتبط با آنتی بیوتیک

تداخلات دارویی:

داروهای واژینال دیگر: استفاده همزمان با سایر داروهای موضعی واژینال ممکن است اثر بخشی هر کدام را کاهش دهد.
تداخل با وسایل جلوگیری از بارداری: کلوتریمازول / کلیندامایسین واژینال میتواند اثر بخشی کاندوم ها و دیافراگم های لاتکسی را کاهش دهد.
اجتناب از استفاده همزمان با سایر محصولات واژینال: مانند تامپون، دوش های واژینال اثر بخشی دارو را کاهش میدهد.

هشدارها و احتیاط ها:

دوره درمان کامل گردد. (حتی در دوران قاعدگی)

در صورت بروز درد شکمی، تب، ترشحات بدبو واژن، با پزشک مشورت گردد.

برای کنترل منابع عفونت یا جلوگیری از عود مجدد عفونت، اصول بهداشت رعایت گردد از مقاربت اجتناب و در غیر صورت همسر حتماً از کاندوم استفاده نماید.

در صورت ابتلا به اسهال در طول و یا بعد از درمان بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت مصرف دارو به علت ترشحات مهبل، امکان آلودگی لباس ها وجود دارد.

در صورت بروز علائم حساسیت به دارو (قرمزی، خارش، سوزش) درمان قطع و با پزشک مشورت گردد.

هنگام استعمال اپلیکاتور توصیه میگردد که بیمار به پشت خوابیده و حتی الامکان اپلیکاتور را تا عمق واژن فرو ببرد تا کرم کاملاً داخل واژن قرار گیرد.

در طول درمان و در صورت وجود عفونت واژینال، از رابطه جنسی پرهیز کنید تا از انتقال عفونت به شریک جنسی جلوگیری شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موزات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و داروساز مشورت نمایید:

التهاب دهانه رحم (سروسیست)، التهاب واژن (واژینیت)، عوارض عصبی (گیجی، سردرد)، ناراحتی های گوارشی، حساسیت مانند: سوزش، خارش، قرمزی، جوش برروی ساق پا، تورم و یا سایر علائم تحریک پوستی، ترشحات واژن، کرامپ یا درد شکمی و معده، احساس سوزش و یا ناراحتی در آلت تناسلی شریک جنسی

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی با تجویز و توصیه پزشک مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

