

اثرات درمانی:

کپسول فارماپین حاوی "ایبوپروفن" به عنوان ضد التهاب و ضد درد، "استامینوفن" به عنوان ضد تب و ضد درد و "کافئین" محرک سیستم اعصاب مرکزی است.

موارد مصرف دارو:

برای تسکین درد های خفیف تا متوسط مانند سردرد، دردهای عصبی، ماهیچه ای، مفصلی، دندان درد، دیس منوره و با اثر کمتری در دردهای بعد از عمل جراحی، ضد تب و تسکین دردهای آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت استفاده می‌گردد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- به منظور کاهش تحریکات گوارشی، دارو را همراه با غذا و با یک لیوان آب میل نمایید.
- جهت جلوگیری از بی خوابی، از مصرف این دارو در هنگام خواب خودداری فرمایید.
- اگر یک دوز از داروی فارماپین را فراموش کردید، برای جبران دوز فراموش شده، دو دوز را با هم مصرف نکنید.

موارد منع مصرف:

بیماران با سابقه حساسیت نسبت به ایبوپروفن، استامینوفن، کافئین یا سایر اجزای فرمولاسیون بیماران با سابقه سندرم پولیپ بینی، آنژیوادم، اسپاسم برونش بیماران با سابقه حساسیت به آسپیرین و دیگر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
داروهای القاء کننده آنزیم کبدی و سایر داروها با سمیت کبدی، باربیتورات‌ها
داروهای ضد انعقاد خون کومارینی
داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی، آسپیرین
داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (MAOIs)
مصرف طولانی مدت الکل

هشدارها و احتیاط ها:

این دارو ممکن است باعث گیجی، کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، با احتیاط مصرف نمایید.
در هنگام مصرف این دارو، از آشامیدن مقادیر زیاد نوشابه های حاوی کافئین، قهوه و چای خودداری نمایید.
در بیماریانی با سابقه حساسیت به دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپیرین، مصرف این دارو ممکن است باعث آنافیلاکسی گردد.
از مصرف این دارو در نوزادان تا ۶ ماهه به دلیل عدم توانایی متابولیسم کردن کافئین خودداری نمایید.
در صورت بروز مشکلاتی از قبیل درد شدید معده، بثورات پوستی، تهوع و استفراغ مصرف دارو را قطع نمایید.
از مصرف سایر فرآورده های حاوی استامینوفن با این دارو خودداری نمایید، زیرا مصرف زیاد استامینوفن ممکن است منجر به آسیب کبدی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
ناراحتی معده، آتمی همولیتیک، اگرانولوسیتوز، کهیر، جوش های جلدی، تب، کاهش قند خون، خواب آلودگی، آسیب های شدید کبدی، تهوع و استفراغ، آسیب های کلیوی

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی، با تجویز و توصیه پزشک مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

