

اثرات درمانی:

ترامادول یک داروی ضد درد اپیوئیدی است که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می‌شود، مکانیسم اثر آن کاملاً شناخته شده نیست اما احتمالاً به وسیله اتصال به رسپتورهای مواد مخدر (μ) باعث مهار باز جذب نوراپی نفرین و سروتونین می‌گردد.

موارد مصرف دارو:

در درمان دردهای متوسط و نسبتاً شدید.

در درمان دردهای مزمن مانند کمر درد، دردهای عصبی، درد مفاصل و استخوان و دردهای سرطانی

بیمارانی که تحمل مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی را ندارند.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.

فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

برای درمان اثرات کلینیکی ناشی از مصرف مقادیر بالا شامل تهوع، سردرد، احساس سرما و خشکی پوست می باشد و برای درمان مسمومیت، شست و شوی معده جهت کاهش جذب دارو به همراه تجویز آنتاگونیست های مخدر مانند نالوکسان و درمان های حمایتی لازم باید انجام گیرد.

با توجه به خطرات سوء مصرف و اعتیاد این دارو تنها زمانی که با مابقی مسکن ها درمان نشده باشند، تجویز می شود.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به ماده موثره ترامادول و یا هر یک از اجزای سازنده آن

- در مسمومیت حاد با الکل

- داروهای خواب آور، مسکن ها، دارو های اپیوئیدی

تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان ترامادول با داروهای ذیل باید اجتناب کرد:

الکل و داروهای بی حسی.

داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی مانند ضد افسردگی های سه حلقه ای، ضد دردهای مخدر، داروهای خواب آور

مهار کننده های مونو آمینواکسیداز، ترامادول با وقفه در جذب نوراپی نفرین و سروتونین موجب تشدید عوارض آنتی کولینرژیک این دارو می گردد.

هشدارها و احتیاط ها:

از مصرف داروهای های تضعیف سیستم عصبی و الکل همراه با ترامادول اجتناب گردد.

این دارو ممکن است باعث سرگیجه یا خواب آلودگی شود لذا پس از مصرف این دارو از انجام کارهایی مانند رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

در دوران مصرف دارو تغییر وضعیت از حالت نشسته به حالت ایستاده با احتیاط انجام شود.

احتمال بروز اعتیاد و سوء مصرف این دارو وجود دارد.

در صورت مشاهده علائم سندرم سروتونین، مانند آشفته گی، تهوع، تب، تعریق، لرز، ضریان قلب سریع، سفتی عضلات پرش عضلانی، از دست دادن هماهنگی، حالت تهوع و استفراغ فوراً به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

واکنش های حساسیتی، تنگی نفس، تشنج، کاهش ضریان قلب، خشکی دهان، اختلالات بینایی و تکرر ادرار، استفراغ، یبوست، سبکی سر، سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد، از دست دادن اشتها، کاهش وزن، احساس درد شدید در معده و شکم.

بارداری و شیردهی:

ترامادول از سد جفت عبور کرده و در شیر نیز ترشح می شود، بنابراین مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.

شرایط نگهداری:

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)

تهران - ایران

