

اثرات درمانی:

موپیروسین یک آنتی‌بیوتیک موضعی مؤثر برای درمان عفونت‌های باکتریایی پوست، به‌ویژه زردزخم، است. این دارو قادر است پوست را از عفونت‌های باکتریایی که عمدتاً توسط گونه‌های باکتریایی استافیلوکوک و استرپتوکوک ایجاد می‌شوند، پاک کند. پماد موپیروسین در غلظت‌هایی که پس از مصرف موضعی در محل استعمال ایجاد می‌کند، به‌واسطه جلوگیری از ساخت پروتئین‌های ضروری برای رشد و تکثیر باکتری، می‌تواند اثر باکتری‌کشی داشته باشد.

به دلیل مکانیسم اثر اختصاصی، موپیروسین معمولاً با سایر گروه‌های آنتی‌بیوتیکی مقاومت متقاطع نشان نمی‌دهد. با این حال، در برخی مناطق یا در برخی سویه‌های باکتریایی، مقاومت نسبت به موپیروسین گزارش شده است و در چنین شرایطی ممکن است اثربخشی دارو کاهش یابد.

جذب سیستمیک موپیروسین پس از مصرف موضعی روی پوست سالم بسیار ناچیز است. در صورت جذب، دارو به سرعت به متابولیت اصلی خود، مونیک اسید، تبدیل می‌شود که فاقد فعالیت ضدباکتریایی است و عمدتاً از طریق کلیه ها دفع می‌گردد.

موارد مصرف دارو:

پماد موپیروسین ۲ درصد برای درمان موضعی عفونت‌های باکتریایی پوست در بزرگسالان و کودکان بالای ۴ هفته استفاده می‌شود.

این دارو برای درمان عفونت‌های پوستی نظیر:

- التهاب فولیکول مو، زردزخم، جوش‌های عودکننده، سایر عفونت‌های پوستی ایجاد شده توسط گروهای مختلف باکتریایی نظیر: استافیلوکوک‌ها، استرپتوکوک‌ها و اشریشیا کلی، درمان عفونت‌های پوستی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین

مصرف موپیروسین برای عفونت‌هایی که عامل آن‌ها نسبت به دارو مقاوم است، ممکن است اثربخشی کافی نداشته باشد. بنابراین، در صورت عدم بهبود علائم یا بدتر شدن عفونت، بیمار باید مجدداً توسط پزشک ارزیابی شود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

این دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف خودسرانه آن خودداری نمایید.
نحوه مصرف:

- معمولاً دارو ۲ تا ۳ بار در روز استفاده می‌شود، مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد.
- دست‌ها و ناحیه مبتلا را تمیز و خشک کنید.
- مقدار کمی از پماد را روی ناحیه مبتلا به آرامی بمالید.
- در صورت نیاز، می‌توان ناحیه درمان‌شده را با گاز استریل پوشاند.
- پس از مصرف دارو، دست‌ها را به‌خوبی بشویید.
- برای جلوگیری از تماس مستقیم با ناحیه عفونی، می‌توان از سوآپ پنبه‌ای یا گاز تمیز برای استعمال دارو استفاده کرد.
- دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر علائم عفونت زودتر بهبود یافت یا برطرف شد. قطع زودهنگام درمان می‌تواند احتمال عود عفونت یا ایجاد مقاومت میکروبی را افزایش دهد.

موارد منع مصرف:

مصرف پماد موپیروسین در موارد زیر ممنوع است:

حساسیت شناخته‌شده به موپیروسین و یا هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده فرآورده، وجود نواحی وسیعی از زخم‌های باز و یا پوست آسیب‌دیده که نیاز به درمان دارد، افراد واجد نارسیایی‌های کلیوی.

تداخلات دارویی:

- آنکولاز موضعی
- همزمان با موپیروسین، از مصرف سایر کرم‌ها، لوسیون‌ها یا پمادها روی همان ناحیه خودداری کنید.
- تداخل شناخته‌شده‌ای بین موپیروسین با غذا، نوشیدنی یا الکل مطرح نشده است.
- بیمار باید پیش از شروع مصرف، پزشک یا داروساز را از تمام داروهای مصرفی خود، شامل داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، ویتامین‌ها و مواد معدنی، محصولات گیاهی و فرآورده‌های موضعی مطلع کند.

هشدارها و احتیاط‌ها:

- دارو را به دیگران، حتی در صورت داشتن علائم مشابه، به اشتراک نگذارید.
- این دارو فقط برای استعمال خارجی روی پوست است.



- از تماس دارو با چشم‌ها خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی، چشم‌ها باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
- از مصرف دارو در دهان، بینی، واژن یا سایر سطوح مخاطی خودداری کنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف، به محض یادآوری دارو را استفاده کنید. اگر نزدیک به زمان نوبت بعدی است، نوبت فراموش شده را حذف کرده و برنامه معمول را ادامه دهید.
- از مصرف مقدار دوبرابر یا اضافی دارو خودداری کنید.
- اگر طی ۳ تا ۵ روز بهبود بالینی مشاهده نشد یا عفونت بدتر شد، مراجعه مجدد به پزشک ضروری است.
- در صورت مصرف بیش از حد دارو، مصرف اتفاقی توسط کودک، یا بروز علائم غیرعادی، فوراً با پزشک و یا اورژانس تماس بگیرید.
- بیشتر از ۱۰ روز از دارو استفاده نکنید و پس از ۱۰ روز باقی‌مانده محصول را دور بریزید.
- در صورت بروز علائم حساسیت یا تحریک شدید، مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک مشورت کنید. این علائم می‌توانند شامل خارش شدید، راش یا بثورات پوستی، قرمزی شدید، سوزش یا درد قابل توجه، تورم، کهیر، تاول یا پوسته‌ریزی باشد.
- مصرف طولانی‌مدت آنتی‌بیوتیک‌های موضعی از جمله موپیروسین ممکن است باعث رشد بیش از حد میکروارگانیسم‌های غیرحساس، از جمله قارچ‌ها شود. دارو را فقط به مدت تجویز شده توسط پزشک مصرف کنید.
- مصرف نامناسب، بیش از حد، ناقص یا طولانی‌مدت موپیروسین می‌تواند احتمال ایجاد مقاومت باکتریایی را افزایش دهد. برای کاهش این خطر، دوره درمان باید مطابق دستور پزشک کامل شود.
- برخی فرآورده‌های پماد موپیروسین ممکن است دارای پایه پلی‌اتیلن گلیکول باشند. پلی‌اتیلن گلیکول می‌تواند از زخم‌های باز یا پوست آسیب‌دیده جذب شود و از طریق کلیه‌ها دفع گردد. بنابراین در موارد زیر باید از مصرف آن خودداری گردد، مگر با نظر پزشک: زخم‌های باز وسیع، پوست به‌شدت آسیب‌دیده، سوختگی‌ها یا ضایعات گسترده پوستی، نارسایی کلیوی متوسط تا شدید، سابقه بیماری کلیوی
- پماد موپیروسین نباید روی پوست نزدیک مسیر ورودی مصرف شود، مگر با تجویز پزشک.
- اگرچه موپیروسین به‌صورت موضعی مصرف می‌شود و جذب سیستمیک آن معمولاً ناچیز است، اما آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند باعث اسهال شوند که ممکن است نشانه‌ای از عفونت جدید باشد. اگر اسهال آبکی یا خونی دارید، با پزشک خود تماس بگیرید و از داروهای ضد اسهال استفاده نکنید.

عوارض جانبی:

- مانند تمام داروها، موپیروسین نیز ممکن است در برخی افراد موجب بروز عوارض جانبی شود. همه بیماران این عوارض را تجربه نمی‌کنند.
- عوارض شایع:
سوزش و گزش در محل استفاده از پماد.
- عوارض کمتر شایع:
افزایش ترشحات از محل ضایعه، خارش، قرمزی، درد و تورم موضعی، سوزش و خشکی پوست در محل استفاده از پماد موپیروسین. بثورات آلرژیک، خارش، قرمزی یا درد پوست که می‌تواند در سایر قسمت‌های بدن نیز رخ دهد.
- عوارض جدی:
در صورت بروز هر یک از علائم زیر، مصرف دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک مراجعه کنید:
بثورات پوستی برجسته و خارش‌دار، تورم صورت، مشکل در تنفس و یا از دست دادن هوشیاری که ممکن است نشانه یک واکنش آلرژیک جدی باشد که نیاز به درمان اورژانسی دارد.

بارداری و شیردهی:

- مصرف موپیروسین در دوران بارداری و شیردهی باید فقط در صورت نیاز واضح و تحت نظر و تجویز پزشک انجام شود.
 - در صورت مصرف موپیروسین روی پستان یا نوک پستان، لازم است پیش از شیردهی، محل به‌خوبی شسته شود تا دارو از سطح پوست پاک گردد و از تماس مستقیم شیرخوار با دارو جلوگیری شود.
- #### شرایط نگهداری:
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
 - دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.
 - از یخ‌زدگی فرآورده جلوگیری شود.
 - پس از پایان تاریخ انقضا از دارو استفاده نشود.
 - پس از هر بار مصرف، در تیوپ محکم بسته شود.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

