

اثرات درمانی:

یک ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) است که با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز میزان پروستاگلندین، پروستاگلین و ترومبوکسان کاهش می یابد.

موارد مصرف دارو:

دیکلوفناک در کاهش درد و التهاب ناشی از بیماریهای روماتیسمی شامل آرتريت و دیگر اختلالات عضلانی اسکلتی و سردردهای میگرنی، درد و التهاب دندان، درد های بعد از جراحی و نیز نقرس حاد استفاده می شود.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
در صورت حساسیت به دیکلوفناک، آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی حتماً قبل از مصرف دارو، پزشک خود را مطلع کنید.
در صورت ابتلا به هریک از بیماری های زخم معده، بیماری های دستگاه گوارش، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون بالا، هپاتیت یا سایر بیماری های کبدی، بیماری های کلیوی و یا سابقه ابتلا به آنها، احتیاس مایعات در اندام های تحتانی، آسم و بیماری لوپوس، قبل از مصرف دیکلوفناک پزشک خود را مطلع سازید.
مصرف این دارو ممکن است باعث بروز واکنش های شدید پوستی مثل سندرم استیون جانسون و یا درماتیت شود، در صورت بروز علائم پوستی مصرف دارو را سریعاً قطع کنید.
این دارو در موارد نادر می تواند منجر به شوک آنافیلاکسی شود.
در صورت هرگونه واکنش آلرژیک مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

در افراد حساس به آسپیرین یا دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و بیماران مبتلا به پورفیری کبدی منع مصرف دارد.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان دیکلوفناک با داروهای زیر تداخل دارد، پیش از مصرف همزمان حتماً با پزشک خود مشورت کنید
آسپیرین، متوترکسات، سیکلوسپورین، لیتیم، وارفارین، فوروزماید، داروهای مهارکننده ی آنزیم تبدیل کننده ی آنژیوتانسین (ACEIs) مانند انالاپریل و کاپتوپریل، مهار کننده آنزیم (CYP2C9) مثل وریکونازول، القا کننده آنزیم (CYP2C9) مثل ریفامپین

هشدارها و احتیاط ها:

- در بیماران دچار اختلالات کلیوی، کبدی یا قلبی با حداقل میزان بکار رود (وضعیت عملکرد کلیه باید مرتباً کنترل گردد).
 - در بیماران مبتلا به زخم معده فعال از مصرف آن خودداری گردد. همچنین بیماران با سابقه زخم بهتر است از مصرف این دارو پرهیز نموده و در صورت بروز ضدمات معدی - روده ای مصرف آن قطع گردد.
 - این دارو در افراد پیر و همچنین افرادی که سابقه حمله آسم و حساسیتی دارند، با احتیاط مصرف شود.
- مصرف شیاف ممکن است سبب تحریک موضعی گردد.

عوارض جانبی:

سردرد، سرگیجه، ادم، افزایش فشارخون، نارسای قلبی، بشورات پوستی، کپهر، تهوع، اسهال، درد در ناحیه شکم، اختلالات شنوایی (وزوز گوش)، دفع خون از ادرار، واکنش های آلرژیک، نارسای حاد کلیوی

بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری باید حتماً با تشخیص پزشک صورت گیرد.
مصرف دارو در دوران شیردهی معمولاً توصیه نمیشود.

شرایط نگهداری:

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

