

اثرات درمانی:

مسکن و شل کننده عضلات.

موارد مصرف دارو:

برای تسکین دردهای مرتبط با اسپاسم عضلانی مانند کمردرد، گردن درد، کشیدگی و رگ به رگ شدن.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این قرص که حاوی ۵۰۰ میلی گرم متوکاربامول و ۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن است، برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.
- دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا، با یک لیوان پر از آب میل نمایید.
- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود. لذا ضمن درمان از وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- قرص را به طور کامل بلعیده، از جویدن یا خرد کردن آن خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

فقط با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

در صورت مصرف بیش از حد دارو، با پزشک یا اورژانس بیمارستان تماس بگیرید .

موارد منع مصرف:

- در صورتی که بیماری ها و یا مشکلات زیر را دارید از مصرف قرص ایبوپروفن-متوکاربامول اجتناب نمایید:
- بیماری زخم معده یا خونریزی گوارشی یا بیماری التهابی دستگاه گوارش (مانند کولیت، بیماری کرون).
- مصرف آسپرین (ASA) یا هر دارو ضد التهاب غیر استروئیدی دیگر (NSAIDs).
- حساسیت به ایبوپروفن یا سایر داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) و یا سایر سالیسیلات ها و متوکاربامول.
- پولیپ بینی (ورم داخل بینی) یا سابقه آلرژی مانند آسم، شوک آنافیلاکسی (واکنش آلرژیک تهدید کننده حیات). کهیر، رینیت یا آبریزش بینی که ممکن است به دلیل آلرژی باشد، بثورات پوستی یا سایر علائم آلرژیک.
- دهیدراته شدن (از دست دادن قابل توجه آب بدن) به دلیل استفراغ، اسهال یا کمبود مصرف مایعات.
- درست قبل یا بعد از جراحی قلب.
- بیماری جدی کبد یا کلیه.
- لوپوس اریتماتوز سیستمیک، در سه ماهه سوم بارداری

تداخلات دارویی:

در صورتی که داروهای زیر را مصرف می نمایید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- *آسپرین (ASA)، استامینوفن، ضد انعقادها (رقیق کننده های خون مانند وارفارین)، دیگوکسین، داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین، دیورتیک ها (مانند هیدروکلروتیازید)، متوترکسات، لیتیموم، داروهای متصل به پروتئین از جمله پروبنسید، تیروکسین، آنتی بیوتیک ها، سیکلوسپورین، فنی توفین، کورتیکواستروئیدها یا بنزودیازپین ها، سایر NSAID ها یا داروهای کاهنده فشار خون.

هشدارها و احتیاط ها :

در صورت وجود مشکلات یا بیماری های زیر این دارو را با احتیاط مصرف نمایید:

- افراد مبتلا به نارسایی قلبی، فشار خون بالا.
- افراد مستعد تحریک دستگاه گوارش، دیورتیکولوز، یا سایر بیماری های التهابی دستگاه گوارش مانند کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون.
- کسانی که در معرض مشکلات کلیوی یا کبدی هستند، کسانی که دیورتیک ها را مصرف می کنند و افراد مسن.
- در صورت مشکل یا درد هنگام ادرار کردن، فوراً مصرف این دارو را قطع کنید.



- احتمال خونریزی معده در افراد مسن تر از ۶۰ سال، بیماران با سابقه زخم معده یا خونریزی گوارشی، بیمارانی که داروهای رقیق کننده خون یا داروهای استروئیدی مصرف می کنند.
- افرادی که الکل مصرف میکنند.
- دیابت، بیماری تیروئید، آسم، گلوکوم، اختلال لخته شدن خون (مانند به عنوان هموفیلی).
- ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود.
- در افراد مسن با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

- سوزش سر دل، یبوست، حالت تهوع، نفخ، عصبی بودن یا بی خوابی.
- در صورت بروز عوارض گوارش معده با غذا یا شیر مصرف شود.
- سایر عوارض جانبی این دارو چیست؟
- علائم شدید واکنش آلرژیک (شوک آنافیلاکسی)، از جمله: بثورات، خارش شدید/ قرمزی، تاول، تورم یا مشکل در تنفس
- خون در استفراغ، مدفوع سیاه یا خونی
- درد شکم، استفراغ، اسهال
- زنگ یا وزوز در گوش / سرگیجه
- تغییر در دید از جمله: تاری یا کاهش دید
- مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
- این دارو برای زنان باردار و شیرده استفاده نمی شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

