

اثرات درمانی:

شربت نئونکس (دس لوراتادین) است یک آنتی هیستامین نسل دوم است که برای درمان علائم آلرژی استفاده میشود.

موارد مصرف دارو:

درمان رینیت آلرژیک (آلرژی بینی): کاهش عطسه، آبریزش بینی، خارش بینی و چشم ها، رفع گرفتگی و احتقان بینی
درمان کهیر مزمن: کاهش خارش پوست و میتواند برخی فرایندهای التهابی را مهار کند که در واکنش های آلرژیک دخیل هستند.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
شربت دس لوراتادین به صورت شربتی شفاف، تقریباً بی رنگ و با طعم و بوی میوه است که هر ۵ میلی لیتر آن حاوی ۲/۵ میلی گرم دس لوراتادین می باشد و در بطری ۱۲۰ میلی لیتر توسط داروسازی فارماشیمی عرضه می شود.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- رعایت رژیم کم نمک، کم قند یا هر گونه رژیم خاص دیگر
- ۳- بارداری و شیردهی
- ۴- استفاده از سایر داروها
- ۵- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۶- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به دس لوراتادین و یا لوراتادین و هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
اریترومایسین، کتوکونازول، آزیترومایسین، فلوکستین، سایمتیدین مصرف همزمان این داروها ممکن است سطح پلاسمایی دس لوراتادین را بدون تغییر در اثرات بالینی دارو، افزایش دهد.
داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (MAOI) شامل ایزوکربوکسازید، فنلزین، پروکاربازین، سلژیلین و ترانیل سیپرومین در صورت مصرف همزمان با در طی ۲ هفته اخیر بایک داروی مهارکننده MAO عوارض جانبی دس لوراتادین ممکن است شدت یابد، لذا از مصرف همزمان این داروها باید خودداری شود.

هشدارها و احتیاط ها:

- ۱- در افراد سالمند احتمال بروز اثرات آنتی کولینرژیک یا اثرات سیستم اعصاب مرکزی ناشی از مصرف دارو جزئی است.
- ۲- حضور بیماری های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد، در صورت ابتلاء به بیماری های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
انسداد گردن مثانه، هیپرتروفی علامتی پروستات و احتباس ادرار، این دارو ممکن است باعث وخامت احتباس ادراری گردد.
- ۳- اختلال در متابولیسم دس لوراتادین: در افرادی که متابولیسم دس لوراتادین به کندی انجام می شود، اثرات ناخواسته و وابسته به دوز ممکن است بیشتر ایجاد شود.
- ۴- گلوکوم: افزایش مختصر در فشار داخلی چشم ممکن است ایجاد شود که باعث وخامت بیماری می گردد.
- ۵- این دارو ممکن است در نتایج آزمون های پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می گیرد، تأثیر بگذارد. بنابراین لازم است قبل از انجام هرگونه آزمون، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
- ۶- این دارو ممکن است علائم ناشی از مصرف مقادیر زیاد اسپیرین را مخفی نماید و این دارو به اثرات الکلی، سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شامل مسکن ها، آرام بخش ها یا دارو های خواب آور، داروهای ضد درد یا نسخه یا مخدرها، باربیتورات ها، داروهای ضد تشنج، شل کننده های عضلانی، داروهای بیهوشی شامل بیحس کننده های دندان می افزاید.
- ۷- این دارو بندرت باعث خواب آلودگی می شود، لذا قبل از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، از واکنش خود به دارو اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- این دارو کمتر باعث خشکی دهان، بینی و گلو می گردد، برای درمان موقت خشکی دهان می توان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه های یخ در دهان و یا جانشین های بزاق استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از دو هفته، پزشک یا دندانپزشک خود را مطلع نمایید، تداوم خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماریهای دندان و لثه و عفونتهای قارچی گردد.



عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض کمتر شایع یا نادر: شوک آنافیلاکتیک (سرفه، اشکال در بلع، گیجی، ضربان سریع قلب، کهیر، خارش، ورم پلک ها یا اطراف چشم ها، صورت، لب ها یا زبان، تنگی نفس، بشورات جلدی، تنگی در قفسه سینه، خستگی یا ضعف غیر عادی، خس خس سینه)، آریتمی قلبی، تپش قلب، ضربان سریع قلب و کهیر. برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارض مانند سردرد، التهاب گلو، گیجی، خواب آلودگی، خشکی دهان، بیینی و گلو، دیسمنوره، سوء هاضمه، خستگی، میالژی (در عضله) و تهوع با پزشک خود تماس بگیرید.

توجه: در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر ضربان سریع یا نامنظم قلب، خواب آلودگی شدید، توهّم، حملات تشنجی، اشکال در خواب، کاهش فشارخون و خواب آلودگی غیر عادی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

بارداری و شیردهی:

بارداری: مصرف این دارو در انسان طی دوران بارداری مورد مطالعه قرار نگرفته است، اگرچه مطالعات انجام شده در حیوانات بروز ناهنجاریهای مادرزادی یا سایر مشکلات را نشان نداده است، لذا مصرف آن طی این دوران باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.

شیردهی: این دارو در مقادیر جزئی در شیر مادر ترشح میشود و ممکن است باعث عوارض ناخواسته در کودک شیرخوار گردد، ضمن آن که ممکن است جریان شیر را نیز کاهش دهد، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)

تهران - ایران

