

اثرات درمانی:

الانزاپین یک آنتاگونیست انتخابی گیرنده های سروتونین و دوپامین است که به کاهش علائم اسکیزوفرنی، مانیا و افسردگی کمک میکند.

موارد مصرف دارو:

- درمان اختلالات سایکوتیک
- درمان مانیا حاد همراه با اختلال دو قطبی نوع یک

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.
مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.
در طول مدت درمان با داروی الانزاپین از تغییر وضعیت ناگهانی بپرهیزید، زیرا ممکن است باعث سرگیجه شود.
در هنگام مصرف الانزاپین، از مصرف الکل اجتناب نمایید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ماده موثره الانزاپین و یا هر یک از اجزای سازنده آن.
بیماران با سابقه گلوکوم زاویه بسته
بیماران با سابقه مشکلات کبدی
بیماران با سابقه سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS)
افراد سالمد مبتلا به روان پریشی ناشی از زوال عقل (دمانس)

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان دارو با کاربامازپین، امپرازول یا ریفامپین دفع الانزاپین را افزایش و با داروهایی مانند فلووکسامین دفع الانزاپین کاهش می یابد.
الکل و داروهای تضعیف سیستم عصبی همراه با الانزاپین باعث تشدید دپرسیون سیستم عصبی می شوند.
اثرات داروهای آنتی کولینرژیک و داروهای پایین آورنده فشار خون همراه با الانزاپین افزایش و اثر لوودوپا ممکن است توسط الانزاپین خنثی گردد.
مصرف توأم این دارو و داروهای هپاتوتوکسیک باید با احتیاط انجام شود.

هشدارها و احتیاط ها:

به طور کلی داروهای آنتی سایکوتیک ممکن است موجب بروز سندرم نورولپتیک (NMS) شود که علائم آن عبارت است از :
افزایش شدید دمای بدن، گرفتگی و خشکی ماهیچه ها، اختلالات ذهنی و بروز شواهد دال بر ناپایداری اتونومیک و در موارد زیر این دارو باید با احتیاط مصرف شود :
آلزایمر، سرطان سینه، بیماریهای قلبی _ عروقی، بیماریهای مغزی، سابقه ایلئوس پارالیتیک (انسداد عملکردی روده)، گلوکوم با زاویه بسته، هیپرتروفی مشخص پروستات، نارسایی کبدی، صرع یا سابقه آن.
مصرف این داروها همچنین ممکن است باعث سندرم دیسکینزی تاردیو (TDS) شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، با مصرف این دارو نیز ممکن است برخی عوارض ذیل بروز کند.
اضطراب، لرزش، ناراحتی های حرکتی، عوارض اکسترا پیرامیدال، تب، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه، سردرد، اختلالات بینایی، افزایش ضربان قلب، درد ناحیه شکم، دردهای مفصلی، حالت تهوع و استفراغ، تغییرات خلق و خوی، افزایش وزن، کاهش فشار خون و تشنگی، خواب آلودگی، پیوست، تغییرات در متابولیسم قند و چربی خون، خشکی دهان، تعریق زیاد.



بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو حتما باید تحت نظر پزشک بوده و نیز در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد.

شرایط نگهداری:

دارو را در جای خشک، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

