

## کرم واژینال کلوتریمازول ۲٪ Vaginal Cream Clotrimazole 2%

### اثرات درمانی:

کرم کلوتریمازول واژینال ۲٪ یک داروی ضد قارچ است که عمدتاً برای درمان عفونت های قارچی واژن به کار می رود.

### موارد مصرف دارو:

عفونت قارچی واژن (کاندیدیازیس واژینال)

برای تسکین خارش، سوزش عفونت کاندیدا آلیکانس و سایر گونه ها کاندیدا.

### راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.

دوز و مقدار داروی کلوتریمازول، از فردی به فرد دیگر متفاوت است، دارو را دقیقاً همانطور که پزشک به شما تجویز کرده است، استفاده نمایید و از کم یا زیاد کردن مقدار یا مدت مصرف خودداری نمایید.

مقدار ۵ گرم (۱ اپلیکاتور)، از کرم واژینال ترجیحاً شب ها استفاده نمایید.

در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز از داروی کلوتریمازول، در اولین فرصت آن را مصرف نمایید و از دو برابر کردن دوزهای بعدی پرهیز کنید. حتی اگر مدتی پس از مصرف داروی کلوتریمازول برای درمان عفونت قارچی واژن، علائم شما از بین رفت، دوره درمان را کامل کنید زیرا امکان بازگشت مجدد بیماری وجود دارد.

داروی کلوتریمازول واژینال فقط برای استفاده واژینال است.

### موارد منع مصرف:

حساسیت به کلوتریمازول یا سایر اجزای فرمولاسیون

### تداخلات دارویی:

داروهای واژینال دیگر: استفاده همزمان با سایر داروهای موضعی واژینال ممکن است اثر بخشی هر کدام را کاهش دهد.

تداخل با وسایل جلوگیری از بارداری: کلوتریمازول واژینال میتواند اثر بخشی کاندوم ها و دیافراگم های لاتکسی را کاهش دهد.

اجتناب از استفاده همزمان با سایر محصولات واژینال: مانند تامپون، دوش های واژینال اثر بخشی دارو را کاهش میدهد.

### هشدارها و احتیاط ها:

دوره درمان کامل گردد. (حتی در دوران قاعدگی)

در صورت بروز درد شکمی، تب، ترشحات بدبو واژن، با پزشک مشورت گردد.

در صورت خارش مهلی برای اولین بار از دارو استفاده ننماید و بهتر است به پزشک مراجعه گردد.

اگر بعد از ۳ روز استفاده از دارو، بهبودی حاصل نشد، امکان ابتلا به سایر عفونت های دیگر غیر قارچی می باشد، لذا استفاده از دارو متوقف و به پزشک مراجعه کنید.

برای کنترل منابع عفونت یا جلوگیری از عود مجدد عفونت، اصول بهداشت رعایت گردد از مقاربت اجتناب و در غیر این صورت همسر حتماً از کاندوم استفاده نماید.

در صورت مصرف دارو به علت ترشحات مهبل، امکان آلودگی لباس ها وجود دارد.

در صورت بروز علائم حساسیت به دارو (قرمزی، خارش، سوزش) درمان قطع و با پزشک مشورت گردد.

هنگام استعمال اپلیکاتور توصیه میگردد که بیمار به پشت خوابیده و حتی الامکان اپلیکاتور را تا عمق واژن فرو ببرد تا کرم کاملاً داخل واژن قرار گیرد.

در طول درمان و در صورت وجود عفونت واژینال، از رابطه جنسی پرهیز کنید تا از انتقال عفونت به شریک جنسی جلوگیری شود.

پس از هر بار مصرف اپلیکاتور با آب ولرم و صابون شسته شود.

این دارو تنها برای مداوای بیماری های مهلی است، برای چشم و دهان استفاده نگردد.

مصرف دارو در کودکان زیر ۱۲ سال ممنوع می باشد.

### عوارض جانبی:

عوارض جانبی معمولاً خفیف بوده و در برخی موارد عوارض زیر مشاهده میگردد:

درد ناحیه تحتانی شکم، بثورات جلدی، تکرر ادرار، سوزش و تحریکات واژن، ترشحات غیر معمول و بدبو واژن.

### بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیر دهی، با تجویز و توصیه پزشک مصرف گردد.

### شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

