

اثرات درمانی:

این دارو حاوی ۳۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۲۰ میلی گرم کدئین فسفات بوده که دارای اثرات ضد تب و ضد درد می باشد.

موارد مصرف دارو:

رفع علامتی درد های خفیف تا شدید

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
این دارو را پیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید زیرا خطر مسمومیت و اعتیاد به کدئین و همچنین آسیب کبدی ناشی از مصرف طولانی مدت یا مقادیر زیاد استامینوفن وجود دارد.
اگر پس از یک هفته مصرف دارو اثربخش نبود از افزایش دوز خودداری و با پزشک معالج مشورت شود.
در صورت فراموش شدن یک دوز، بلافاصله مصرف شود و از مصرف دوز دو برابر به یکباره خودداری گردد.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ماده موثره استامینوفن یا ضد درد های مخدر، حاملگی (به علت عبور اپیوئید ها از جفت و خطر ایجاد وابستگی و سندرم withdrawal در جنین)، الکلیسم، اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها، مسمومیت، آسم، بیماری های کبدی، هپاتیت ویروسی، بیماری های التهابی شدید روده.

تداخلات دارویی:

با دیگر مخفف های سیستم اعصاب مرکزی، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز، ضد افسردگیهای سه حلقه ای، زیدوودین و نالتروکسان تداخل اثر دارد.

هشدارها و احتیاط ها:

در صورت مصرف سایر داروهایی حاوی استامینوفن یا دیگر مخدرهای ضد درد با احتیاط مصرف شود.
در صورت مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر مخفف های CNS در طول درمان احتیاط کنید.
از مصرف همزمان این دارو با آسپرین یا دیگر سالیسیلات ها، دیگر داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی خودداری کنید، مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.
در صورت بروز سرگیجه، خواب آلودگی، منگی یا احساس خوشی کاذب احتیاط کنید.
در صورت مصرف بیش از حد و یا دوز سمی به اورژانس مراجعه گردد.
هنگام برخاستن ناگهانی از وضعیت خوابیده یا نشسته احتیاط کنید.
در صورت نیاز به هر گونه عمل جراحی (از جمله جراحی های دندانپزشکی) یا درمان های اضطرابی احتیاط کنید.
پس از مصرف طولانی مدت مقادیر زیاد دارو قبل از قطع مصرف آن با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و داروساز مشورت نمایید:
دیرسپیون تنفسی، واکنش های آلرژیک، سرگیجه، تشنج، هذیان، آگرانولوسیتوز، مسمومیت کبدی، افزایش فشارخون، نارسایی کلیوی، ترومبوسیتوپنی به خصوص در بچه ها با دوزهای زیاد.

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری با تجویز و توصیه پزشک مصرف نمایید و در شیردهی از مصرف آن خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

