

اثرات درمانی:

کرم موضعی فارملا پی، یک داروی بی حس کننده موضعی است که با مسدود کردن سیگنال های عصبی در ناحیه آسیب دیده باعث کاهش درد و سوزش در ناحیه می شود.

موارد مصرف دارو:

کرم فارملا پی سطح پوست را برای مدت کوتاهی بی حس می کند، این دارو را پیش از اعمال جراحی بر روی پوست استفاده می شود و این دارو درد را متوقف می سازد اما ممکن است شما همچنان احساس فشار بر روی پوست خود حس کنید. در بزرگسالان، کودکان، نوجوانان برای بی حس کردن پوست در موارد زیر استفاده می شود: هرگونه تزریق و یا سوزن زدن برای مثال آزمایش خون، عمل های جراحی سرپایی، انواع پیوند های پوستی، تسکین درد ناشی از سوختگی های سطحی، نیش حشرات، تحریکات پوستی، هموروئید و شقاق مقعدی.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

کرم را در محل موضع بر روی پوست قرار دهید، برای مثال در محل تزریق از مالیدن کرم بر روی موضع خودداری گردد، لازم است پس از قرار دادن کرم بر روی پوست یک پانسمان پلاستیکی یا نایلونی روی آن قرار دهید به صورتی که کاملاً روی موضع و کرم بپوشاند. لبه های پانسمان پلاستیکی را به دقت مرتب کنید و اجازه دهید به مدت ۶۰ دقیقه در همان حالت باقی بماند. پزشک یا پرستار پیش از انجام عمل یا تزریق، پانسمان را برداشته و کرم را پاک خواهد کرد.
از تماس کرم با چشم و زخم باز خودداری نمایید.
اگر علائم حساسیت یا عوارض جانبی را تجربه کردید، مصرف دارو را قطع و با پزشک مشورت نمایید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به لیدوکائین و پریلوکائین یا سایر اجزای فرمولاسیون
حساسیت به سایر داروهای بی حس کننده موضعی
داشتن زخم باز یا پوست ملتهب
در صورت تغییر رنگ و بو کرم فارملایی

تداخلات دارویی:

در صورتی که در حال استفاده از این داروها هستید، حتماً به پزشک خود اطلاع دهید:
سولفونامیدها مانند سولفامتوکسازول، سایر بی حس کننده های موضعی، ضد آریتمی ها مانند آمیودارون یا مگزپیتین، بتابلاکر ها مانند آتنولول، سایمتیدین

هشدارها و احتیاط ها:

قبل از مصرف این دارو در موارد ذیل با پزشک خود مشورت نمایید:
سابقه ابتلا به کم خونی، سابقه ابتلا به فایبوس یا کمبود آنزیم G6PD، بیماری درماتیت آتوپیک به ویژه در نوزادان نارس و کودکان کمتر از ۱۲ ماه، بیماری مت هموگلوبینمیا، سابقه ابتلا به بیماری کبدی
در کودکان به دلیل احتمال جذب بیشتر این فرآورده و احتمال سمیت با دارو، با احتیاط مصرف نمایید.



از استفاده کرم فارملا پی در نواحی دارای زخم، بریدگی یا جراحت به جز زخم های پا، پوست دچار حساسیت یا آگزما، در اطراف چشم در داخل بینی، گوش، دهان، در داخل مقعد، در ناحیه تناسلی کودکان خودداری نمایید.

در صورت تماس اتفاقی کرم با چشم، آن را با سرم یا آب ولرم شستشو دهید.
در صورتی که کرم فارملا پی همزمان با تزریق واکسن زنده مانند سل وارد پوست گردد، بهتر است برای پیگیری نتیجه انجام واکسیناسیون پس از مدت زمان اعلام شده به پزشک خود مراجعه نمایید.
در صورت بلعیدن سهوی کرم فارملا پی بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومیت مراجعه نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هرکدام از اثرات جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید:

سرگیجه، سوزن سوزن شدن پوست در اطراف دهان و بی حسی زبان، مزه غیر عادی در دهان، زنگ زدن گوش، قرمزی، تورم، رنگ پریدگی پوست در محل استفاده از کرم و سوزش خفیف یا احساس خارش.

در موارد نادر:

خارش، تنگی نفس، فشار خون پایین ممکن است منجر به سرگیجه شود، تورم پوست، لب ها، زبان و یا سایر قسمت های بدن، کبود و خاکستری شدن پوست به علت عدم اکسیژن رسانی کافی.

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری با تجویز و توصیه پزشک مصرف نمایید و در دوران شیردهی کرم فارملا پی مقدار کمی در شیر ترشح می شود با احتیاط و با مشورت پزشک مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

از استفاده کرم پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی آن خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

