

قرص انتریک کوتد آسپیرین ۸۰

Aspirin 80mg Enteric - Coated Tablet

اثرات درمانی:

آسپیرین، استیل سالیسیلیک اسید است که اثرات ضد التهابی و ضد روماتیسمی دارد و مانع تجمع پلاکت‌ها از طریق مهار پروستاگلاندینها میشود.

موارد مصرف دارو:

به عنوان داروی ضد درد، ضدتب و التهاب، ضد انعقاد، باعث کاهش خطر مرگ در بیماران با سابقه سکته و یا درد قلبی و نیز ممانعت از ایجاد حمله های مغزی می گردد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
- دوز و مقدار داروی آسپیرین از فردی به فرد دیگر متفاوت است، لذا دارو را دقیقاً همانطور که پزشک برایتان تجویز کرده است، استفاده نمایید و از کم یا زیاد کردن مقدار و مدت زمان مصرف اجتناب نمایید.
- اگر یک دوز از داروی آسپیرین را فراموش کردید، برای جبران دوز فراموش شده، دو دوز را با هم مصرف نکنید.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه بیماری های ذیل از مصرف این دارو خودداری کنید:

- حساسیت به آسپیرین یا هر NSAID دیگر
- بیماران هموفیلی مبتلا به زخم معده
- بیماران مبتلا به سکته مغزی
- مصرف الکل

تداخلات دارویی:

با داروهای ضد انعقاد، ضد دیابت، داروهای مورد استفاده در آرتريت و نقرس باید تحت نظر پزشک مصرف گردد.

هشدارها و احتیاط ها:

در کودکان زیر ۱۲ سال مبتلا به آبله مرغان، آنفولانزا یا علائم سرماخوردگی، به علت احتمال ایجاد سندرم ری باید با مشورت پزشک مصرف گردد. در صورت ابتلا به بیماری های ذیل با مشورت پزشک آسپیرین را مصرف کنید:

- مشکلات تنفسی و آسم
- مشکلات فشارخون
- مشکلات کبدی
- مشکلات کلیوی
- عمل جراحی و یا دندانپزشکی
- سابقه زخم معده

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هرکدام از عوارض جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید:

- عوارض گوارشی مانند سوزش معده یا روده، سوء هاضمه، حالت تهوع، استفراغ، التهاب و خونریزی معده.
- عوارض تنفسی مانند وخیم تر شدن علائم آسم
- عوارض پوستی مانند کبودی و خونمردگی
- عوارض شنوایی مانند وزوز گوش و کاهش شنوایی
- عوارض خونی مانند طولانی شدن زمان انعقاد خون
- عوارض عصبی مانند تشنج

بارداری و شیردهی:

مصرف در سه ماهه آخر بارداری، به علت ایجاد عوارض در جنین ممنوع می باشد.
مصرف در دوران شیردهی به علت ترشح در شیر مجاز نمی باشد.

شرایط نگهداری:

دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

