

اثرات درمانی:

کرم واژینال کلیندامایسین ۲٪ یک داروی آنتی بیوتیک است که عمدتاً برای درمان بیماری های باکتریایی واژن به کار می رود.

موارد مصرف دارو:

درمان بیماری های باکتریایی واژن (عفونت ناشی از تغییر تعادل طبیعی باکتری های واژن) شامل: هموفیلوس واژینایتیس، گاردنلواژینایتیس، کوریونوباکتریوم واژینایتیس و دیگر عفونت هایی بی هواری واژینال

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برکه راهنما را مطالعه نمایید.

اگر بعد از چند روز مصرف این دارو علائم بیماری بهبود نیافت و یا بدتر شد با پزشک مشورت نمایید.

در ضمن مصرف این دارو از پنبه یا نوار بهداشتی و شورت نخی استفاده نمایید.

در طول مصرف این دارو از مقاربت اجتناب ورزیده و تا سه روز بعد از قطع مصرف دارو نباید از وسایل جلوگیری مانند کاندوم استفاده نمایید.

مصرف این دارو را طبق نظر پزشک تا پایان دوره درمان ادامه دهید (حتی در دوره قاعدگی).

دستها را قبل و بعد از استعمال دارو شسته و از تماس دارو با چشم جلوگیری نمایید.

هنگام استعمال اپلیکاتور توصیه می گردد که بیمار به پشت خوابیده و حتی الامکان اپلیکاتور را تا عمق واژن فرو برد تا کرم کاملاً داخل واژن تخلیه گردد.

حتی اگر مدتی پس از مصرف داروی کلیندامایسین برای درمان عفونت باکتریایی واژن، علائم شما از بین رفت، دوره درمان را کامل کنید زیرا امکان بازگشت مجدد بیماری وجود دارد.

مقدار ۵ گرم (۱ اپلیکاتور)، از کرم واژینال ترجیحاً شب ها استفاده نمایید.

داروی کلیندامایسین واژینال فقط برای استفاده واژینال است.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به کلیندامایسین و لینکومایسین یا سایر اجزای فرمولاسیون

- سابقه بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو یا کولیت مرتبط با آنتی بیوتیک

تداخلات دارویی:

داروهای واژینال دیگر: استفاده همزمان با سایر داروهای موضعی واژینال ممکن است اثر بخشی هر کدام را کاهش دهد.

اجتناب از استفاده همزمان با سایر محصولات واژینال: مانند تامپون، دوش های واژینال اثر بخشی دارو را کاهش میدهد.

از مصرف داروهای ضد اسهال مانند لوبرامید بدون مشورت پزشک خودداری کنید، زیرا علائم کولیت پسودوممبران را تشدید کند.

کلیندامایسین موجب افزایش اثر داروهای مهارکننده عصبی عضلانی می شود.

هشدارها و احتیاط ها:

برای کنترل منابع عفونت یا جلوگیری از عود مجدد عفونت، اصول بهداشت رعایت گردد، از مقاربت اجتناب و در غیر صورت همسر حتماً از کاندوم استفاده نماید.

در صورت مصرف دارو به علت ترشحات مهبل، امکان آلودگی لباس ها وجود دارد.

در صورت بروز علائم حساسیت به دارو (قرمزی، خارش، سوزش) درمان قطع و با پزشک مشورت گردد.

دوره درمان کامل گردد. (حتی در دوران قاعدگی)

در طول درمان و در صورت وجود عفونت واژینال، از رابطه جنسی پرهیز کنید تا از انتقال عفونت به شریک جنسی جلوگیری شود.

پس از هر بار مصرف اپلیکاتور با آب ولرم و صابون شسته شود.

این دارو تنها برای مداوای بیماری های مهبل است، برای چشم و دهان استفاده نگردد.

مصرف دارو در کودکان زیر ۱۲ سال ممنوع می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و داروساز مشورت نمایید.

خارش یا سوزش واژن، ترشحات غیر عادی واژن، سردرد، سرگیجه، یبوست، کمردرد، عوارض پوستی، کهیر و عوارض گوارشی

بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی با تجویز پزشک مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

