

اثرات درمانی:

آزیترومایسین یک داروی ضد باکتری ماکرولیدی است که برای درمان بیماران مبتلا به سویه های حساس میکرو ارگانیسم ها در شرایط خاص استفاده میشود.

موارد مصرف دارو:

جلوگیری از عفونت های خفیف تا متوسط

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.

فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

در صورت مصرف داروهای حاوی پتاسیم و منیزیم قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیماران نباید بیشتر از دوز تجویز شده استفاده کنند و همزمان از مصرف محصولات آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم خودداری کنند.

در صورت هرگونه واکنش آلرژیک مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت بروز استفراغ و تحریک پذیری هنگام تغذیه کودک فوراً با پزشک تماس بگیرید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ماده موثره آزیترومایسین و هر آنتی بیوتیک ماکرولید و یا هر یک از اجزای سازنده آن.

مصرف همزمان با داروی پیموزاید، آمیودارون و هیدروکسی کلروکین منع مصرف مطلق دارد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

سیکلواسپورین، دیگوکسین، وارفارین، کلشی سین، داروهای مهار کننده HMG-CoA ردوکتاز نظیر آتورواستاتین، رزواستاتین و..

داروهای آنتی اسید، تاکرولیموس، ریفامپین، مشتقات ارگوتامین، نلفیناویر

هشدارها و احتیاط ها:

- در صورت بروز یرقان، ادرار تیره و یا آنسفالوپاتی کبدی مصرف آزیترومایسین را قطع کرده و عملکرد آنزیم های کبدی را چک کنید.

- در صورت بروز اسهال با مصرف آنتی بیوتیک های ماکرولید (آزیترومایسین) به پزشک مراجعه کنید.

- آزیترومایسین را در افراد مبتلا به QT اینتروال طولانی و مشکلات قلبی از جمله (آریتمی قلبی و...) باید با احتیاط مصرف کنید.

- در صورتی که حساسیت مفرط به واکنش های آلرژیک جدی مانند آنژیوادم، آنافیلاکسی و واکنش های پوستی دارید از مصرف آزیترومایسین خودداری نمایید و به پزشک خود اطلاع دهید.

- در صورت ابتلا به میاستنی گراویس در مصرف این دارو احتیاط کنید.



- داروهای آنتی بیوتیکی می توانند باعث اسهال شوند که ممکن است نشانه ای از عفونت جدید باشد در این صورت از مصرف داروهای ضد اسهال خودداری نمایید و با پزشک خود مشورت نمایید.
- در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی و بیماری های کلیوی این دارو را با احتیاط و نظر پزشک مصرف کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک های ماکرولید ممکن است باعث از دست دادن قابل برگشت شنوایی، تهوع شدید و استفراغ شود.

در صورت داشتن عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

ضربان قلب شدید، تنگی نفس، معده درد، اسهال، تب، احساس خستگی، خارش، حالت تهوع، نفس زدن شدید، مشکلات کبدی و کلیوی، زردی پوست، سردرد و سرگیجه

بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمیشود، چون مطالعات کافی و کنترل شده ای از مصرف این دارو در زنان باردار صورت نگرفته است.

مصرف این دارو در دروان شیردهی نیز باید حتما با تشخیص پزشک صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

دور از نور ، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

